КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2016-2017

nuSEED®

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ

ОТ ИННОВАЦИОННОЙ СЕМЕННОЙ КОМПАНИИ.

ПОВЫШАЕМ ЦЕННОСТЬ УРОЖАЯ,

ПОСТАВЛЯЯ СЕМЕНА

ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

nuSEED®

Nuseed — компания нового типа, предлагающая семена для сельскохозяйственного рынка, стремящаяся к непрерывному повышению пищевой и кормовой ценности семян широкого применения.



Мы объединяем опыт расположенных по всему миру подразделений компании, применяя полученные знания для решения проблем наших клиентов на местном уровне. Продукция компании Nuseed известна на рынках многих стран, при этом региональные подразделения разрабатывают гибриды и необходимые качества продукции, создают технологии производства и обработки семян в соответствии с конкретными климатическими, почвенными и рыночными условиями.

Неподдельная преданность своему делу и постоянное стремление к максимизации урожайности позволили компании Nuseed достичь невиданной глубины опыта и знаний в области зерновых культур, которые являются источником питания и топлива во всем мире. Наша цель — не только настоящее данной отрасли, но и ее будущее.

О НАС

Компания Nuseed руководствуется огромным стремлением наших клиентов к совершенству. Наша преданность делу лежит в основе нашей культуры и всего, что мы делаем. Наше руководство, исследовательские группы, наши региональные представители — все мы искренне стремимся:

- облегчить ведение бизнеса с нашей компанией
- предугадывать потребности фермеров, переработчиков и потребителей,
- достигать успеха и делиться им в области инновационных технологий обработки семян

ПАТРИК ДИТРИХ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
+33-6-2923-5262
patrick.dieterich@eu.nuseed.com

ИГОРЬ САВИНСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПО СНГ
+7-988-528-3535
igor.savinskiy@ru.nuseed.com

ГОРБАЧЕВ АЛЕКСАНДР
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО СЕМЕНАМ
В РОССИИ
+7-988-247-63-96
aleksandr.gorbachev@ru.nuseed.com

КАЧАПКИН ВАСИЛИЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО СЕМЕНАМ
В РОССИИ
+7-905-062-09-78
vasiliy.kachapkin@ru.nuseed.com

Центральный офис Nuseed Europe
Barnett House
53 Fountain Street
Manchester, M2 2AN UK
+44 (0) 161 235 6446

Все сотрудники компании Nuseed, начиная от отдела селекции и развития и заканчивая продажами и клиентским обслуживанием, непрерывно стремятся к инновациям в своей работе. Мы сфокусированы на трех основных сельскохозяйственных культурах, имеющих огромный потенциал с точки зрения экономической важности для производителей: подсолнечник, сорго и рапс яровой. Мы создаем решения, работающие на местном уровне и позволяющие нам предлагать выгодные решения для конкретных регионов.



ПОДСОЛНЕЧНИК
СТР. 6

СОРГО
СТР. 23

РАПС ЯРОВОЙ
СТР. 26



ПОДСОЛНЕЧНИК

nuSEED®

Ягуар 2 (X4367)*

ОБЗОР

Кондитерский тип

Полосатый подсолнечник

Гибрид Clearfield

Размер семян: 17-18 мм (изображение не в масштабе)

Идеален в качестве неочищенного кондитерского продукта

Среднераннее созревание

Вегетационный период: 98-105 дней**

Clearfield Production System

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Если не указано иное, используется стандартная оценка по 9-и бальной системе.

1=плохо / 9=отлично



Средняя высота	155-175 см
Потенциальная урожайность	9
Влагоотдача при созревании	9
Прорастание семян	8
Устойчивость к полеганию	9
Устойчивость к стрессу	8
Рекомендуемая густота посева	40 000-50 000 раст./га

* Проводится регистрация.
** Центрально-Черноземный регион.

X 4337*

ОБЗОР

Кондитерский тип

Полосатый подсолнечник

Размер семян: 19,5-20,5 мм (изображение не в масштабе)

Идеален в качестве неочищенного кондитерского продукта

Среднераннее созревание

Вегетационный период: 102-111 дней

Clearfield Production System

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Если не указано иное, используется стандартная оценка по 9-и бальной системе.

1=плохо / 9=отлично



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средняя высота:	160-185 см
Потенциальная урожайность	9
Высыхание при созревании	8
Прорастание семян	9
Устойчивость к полеганию	9
Устойчивость к стрессу	8
Рекомендуемая густота посева	40 000-50 000 раст./га**

* Проводится регистрация
** Центрально-Черноземный регион.

9180 ДМР*

ОБЗОР

Кондитерский тип

Полосатый подсолнечник

Размер семян: 17-18,5 мм (изображение не в масштабе)

Идеален в качестве неочищенного кондитерского продукта

Среднераннее созревание

Вегетационный период: 97-102 дня

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Если не указано иное, используется стандартная оценка по 9-и бальной системе.

1=плохо / 9=отлично

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средняя высота:	160-175 см
Потенциальная урожайность	9
Влагоотдача при созревании	9
Прорастание семян	9
Устойчивость к полеганию	9
Устойчивость к стрессу	8
Рекомендуемая густота посева	40 000-50 000 раст./га

* Проводится регистрация.
** Центрально-Чернозёмный регион

HCH 12055*

ОБЗОР

Масличный тип

Линолевый подсолнечник

Среднераннее созревание

Вегетационный период: 105-110 дней

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Если не указано иное, используется стандартная оценка по 9-и бальной системе.

1=плохо / 9=отлично



ДЕТАЛИ

Средняя высота:	165-180 см
Потенциальная урожайность	8
Влагоотдача при созревании	8
Прорастание семян	8
Устойчивость к полеганию	7
Устойчивость к стрессу	9
Рекомендуемая густота посева	55 000-65 000 раст./га**
Масличность	49-51%

* Проводится регистрация.
** Центрально-Черноземный регион.

Камаро 2 (X6878)

ОБЗОР

Масличный тип

Линолевый подсолнечник

Гибрид Clearafield

Среднераннее созревание

Вегетационный период: 100-108 дней**

Clearfield Production System

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Если не указано иное, используется стандартная оценка по 9-и бальной системе.

1=плохо / 9=отлично

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средняя высота:	170-180 см
Потенциальная урожайность	9
Влагоотдача при созревании	8
Прорастание семян	8
Устойчивость к полеганию	9
Устойчивость к стрессу	9
Рекомендуемая густота посева	55 000-65 000 раст./га**
Масличность	50-52%

** Центрально-Черноземный регион.

X4219*

ОБЗОР

Масличный тип

Линолевый подсолнечник

Гибрид толерантен к гербицидам группы сульфонилмочевины.

Среднераннее созревание

Вегетационный период: 99-106 дней**

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Если не указано иное, используется стандартная оценка по 9-и бальной системе.

1=плохо / 9=отлично

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средняя высота:	165-175 см
Потенциальная урожайность	9
Высыхание при созревании	9
Прорастание семян	8
Устойчивость к полеганию	8
Устойчивость к стрессу	8
Рекомендуемая густота посева	55 000-65 000 раст./га**
Масличность	49-51%

* Проводится регистрация.
** Центрально-Черноземный регион.

Импакт (12M002)

ОБЗОР

Масличный тип

Линолевый подсолнечник

Гибрид Clearafield

Среднераннее созревание

Вегетационный период: 100-105 дней**

Clearfield Production System

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Если не указано иное, используется стандартная оценка по 9-и бальной системе.

1=плохо / 9=отлично



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средняя высота:	160-175 см
Потенциальная урожайность	9
Влагоотдача при созревании	9
Прорастание семян	8
Устойчивость к полеганию	8
Устойчивость к стрессу	9
Рекомендуемая густота посева	55 000-65 000 раст./га
Масличность	47-50%

** Центрально-Черноземный регион.

Торино

ОБЗОР

Масличный тип

Линолевый подсолнечник

Гибрид Clearfield

Среднепозднее созревание

Вегетационный период: 110-116 дней**

Clearfield Production System

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Если не указано иное, используется стандартная оценка по 9-и бальной системе.

1=плохо / 9=отлично

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средняя высота:	160-170 см
Потенциальная урожайность	9
Влагоотдача при созревании	8
Прорастание семян	8
Устойчивость к полеганию	9
Устойчивость к стрессу	9
Рекомендуемая густота посева	55 000-65 000 раст./га
Масличность	48-50%

** Центрально-Черноземный регион.

Н4ЛМ408 (НЛК12М008)

ОБЗОР

Масличный тип

Линолевый подсолнечник

Гибрид Clearfield

Среднераннее созревание

Вегетационный период: 100-105 дней**

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Если не указано иное, используется стандартная оценка по 9-и бальной системе.

1=плохо / 9=отлично

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средняя высота:	170-180 см
Потенциальная урожайность	8
Влагоотдача при созревании	8
Прорастание семян	9
Устойчивость к полеганию	8
Устойчивость к стрессу	9
Рекомендуемая густота посева	55 000-65 000 раст./га
Масличность	48-50%

** Центрально-Черноземный регион.

Талон*

ОБЗОР

Масличный тип

Линолевый подсолнечник

Гибрид толлерантен к гирбицидам группы сульфонил мочевины

Ранее созревание

Вегетационный период: 93-102 дня**

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Если не указано иное, используется стандартная оценка по 9-и бальной системе.

1=плохо / 9=отлично



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средняя высота:	140-150 см
Потенциальная урожайность	7
Влагоотдача при созревании	9
Прорастание семян	9
Устойчивость к полеганию	8
Устойчивость к стрессу	8
Рекомендуемая густота посева	50 000-60 000 раст./га
Масличность	44-48%

* Проводится регистрация
** Центрально-Черноземный регион

H/O Кобальт 2 (X6822)

ОБЗОР

- Масличный тип
- Высокоолеиновый подсолнечник
- Гибрид Clearfield
- Ранее созревание
- Вегетационный период: 93-102 дня**

Clearfield Production System

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Если не указано иное, используется стандартная оценка по 9-и бальной системе.

1=плохо / 9=отлично

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средняя высота:	150-165 см
Потенциальная урожайность	9
Влагоотдача при созревании	9
Прорастание семян	8
Устойчивость к полеганию	9
Устойчивость к стрессу	9
Рекомендуемая густота посева	55 000-65 000 раст./га
Масличность	48-50%

** Центрально-Черноземный регион.

H4XM411*

H/O

ОБЗОР

- Масличный тип
- Высокоолеиновый подсолнечник
- Гибрид Clearfield
- Среднераннее созревание
- Вегетационный период: 100-105 дней**

Clearfield Production System

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Если не указано иное, используется стандартная оценка по 9-и бальной системе.

1=плохо / 9=отлично



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средняя высота:	160-175 см
Потенциальная урожайность	9
Влагоотдача при созревании	8
Прорастание семян	9
Устойчивость к полеганию	8
Устойчивость к стрессу	8
Рекомендуемая густота посева	55 000-65 000 раст./га
Масличность	47-50%

* Проводится регистрация.
** Центрально-Черноземный регион.

HXK12M010

H/O

ОБЗОР

Масличный тип

Высокоолеиновый подсолнечник

Гибрид Clearfield

Среднее созревание

Вегетационный период: 102-108 дней**

Clearfield Production System

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Если не указано иное, используется стандартная оценка по 9-и бальной системе.

1=плохо / 9=отлично



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средняя высота:	160-175 см
Потенциальная урожайность	9
Влагоотдача при созревании	8
Прорастание семян	9
Устойчивость к полеганию	8
Устойчивость к стрессу	9
Рекомендуемая густота посева	55 000-65 000 раст./га
Масличность	50-52%

** Центрально-Черноземный регион.

Сьерра

H/O

ОБЗОР

Масличный тип

Высокоолеиновый подсолнечник

Среднепозднее созревание

Вегетационный период: 112-115 дней**

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Если не указано иное, используется стандартная оценка по 9-и бальной системе.

1=плохо / 9=отлично

ДЕТАЛИ

Средняя высота:	175-185 см
Потенциальная урожайность	9
Влагоотдача при созревании	9
Прорастание семян	9
Устойчивость к полеганию	8
Устойчивость к стрессу	9
Рекомендуемая густота посева	55 000-60 000 раст./га
Масличность	47-50%

** Центрально-Черноземный регион.

Сравнение кондитерских гибридов

	Ягуар 2 (X4367)	X4337	9180 ДМР
Тип семян	Кондитерский	Кондитерский	Кондитерский
Цвет семян	Полосатый	Полосатый	Полосатый
Устойчивость к гербицидам	CL	CL	SU
Размер семян (мм)	17-18	19.5-20.5	18.5-20
Назначение	Неочищенный кондитерский	Неочищенный кондитерский	Неочищенный кондитерский
Группа созревания	Среднеранний	Среднепоздинй	Среднеранний
Период вегетации (дней)**	98-105	102-111	96-102
Средняя высота (см)	155-175	160-185	160-175
Потенциальная урожайность (т/га)	9	9	8
Влагоотдача при созревании	9	8	9
Прорастание семян	9	9	9
Устойчивость к полеганию	9	9	8
Устойчивость к стрессовым условиям	8	8	9
Рекомендуемая густота посева (раст./га)	40 000-50 000	40 000-50 000	40 000-50 000
ЛМР	4	4	7
Белая гниль	3	3	3
Фомопсис	4	4	4

** Центрально-Черноземный регион.

Сравнение масличных гибридов

	НСН 12055	Камаро 2 (X6878)	X4219	Импакт (12M002)
Масличный тип	Линолевый	Линолевый	Линолевый	Линолевый
Устойчивость к гербицидам		CL	SU	CL
Группа созревания	Средний	Среднеранний	Среднеранний	Среднеранний
Период вегетации (дней)**	105-110	100-108	96-102	100-105
Средняя высота (см)	165-180	170-180	165-175	160-175
Потенциальная урожайность	8	9	9	9
Влагоотдача при созревании	8	8	9	9
Прорастание семян	8	8	8	8
Устойчивость к полеганию	7	9	8	8
Устойчивость к стрессовым условиям	9	9	9	9
Рекомендуемая густота посева (раст./га)	55 000-60 000	55 000-65 000	55 000-65 000	55 000-65 000
Масличность	49-51%	50-52%	49-51%	47-50%
ЛМР	1	7	1	7
Белая гниль	6	5	5	5

** Центрально-Черноземный регион.

Торино	Н4ЛМ408 (НЛК12М008)	Талон	Кобальт 2 (Х6822)	Н4ХМ411	НХК12М010	Сьерра
Линолевый	Линолевый	Линолевый	Высокоолеиновый	Высокоолеиновый	Высокоолеиновый	Высокоолеиновый
CL	CL	SU	CL	CL	CL	
Среднепоздний	Среднеранний	Ранний	Ранний	Средний	Средний	Среднепоздний
110-116	100-105	93-102	93-102	97-107	102-108	112-115
160-170	170-180	140-150	150-165	165-180	160-175	175-185
9	8	7	8	8	9	9
8	8	9	8	8	8	9
8	9	9	9	8	9	9
9	8	8	8	7	8	8
9	9	8	9	9	9	9
55 000-60 000	55 000-65 000	50 000-60 000	55 000-65 000	55 000-65 000	55 000-65 000	55 000-60 000
48-50%	48-50%	45-48%	48-50%	49-51%	50-52%	47-50%
1	7	5	7	5	7	1
5	5	4	5	4	4	5

СОРГО

nuSEED®

Аляска

ОБЗОР

Ранее созревание

55-60 дней до 50% цветения

Средняя высота: 100-114 см

Танин в зерне отсутствует

Рекомендуемая густота посева — около 120 000-130 000 раст/га

Устойчивость к злаковой тле биотипов C и A (АФИДЫ)

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Если не указано иное, используется стандартная оценка по 9-и бальной системе.

1=плохо / 9=отлично



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Потенциальная урожайность	9
Цвет зерна	Белый
Цвет растения	Фиолетовый
Тип метелки	SC
Выдвижение метелки	9
Обмолачиваемость	8
Устойчивость к стрессовым условиям	9

Томагавк

ОБЗОР

Ранее созревание

60-65 дней до 50% цветения

Средняя высота: 114-127 см

Танин в зерне отсутствует

Рекомендуемая густота посева — около 120 000-130 000 раст/га

Устойчивость к злаковой тле биотипов C и A (АФИДЫ)

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Если не указано иное, используется стандартная оценка по 9-и бальной системе.

1=плохо / 9=отлично



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Потенциальная урожайность	9
Цвет зерна	Светло-красный
Цвет растения	Фиолетовый
Тип метелки	SC
Выдвижение метелки	9
Обмолачиваемость	9
Устойчивость к стрессовым условиям	9

ПЕРСПЕКТИВЫ РАПСА ЯРОВОГО

Будь то повышение эффективности производства и рентабельности переработки или когда речь идет о здоровье потребителей, компания Nuseed обращается к яровому рапсу. Наша преданность делу заметна по впечатляющему ассортименту предлагаемых продуктов, а также ключевой роли, которую компания играет в поиске инновационных способов использования рапсового масла.

На сегодняшний день большинство наших разработок, связанных с яровым рапсом, предназначены для рынка Австралии, однако мы работаем над рядом проектов по адаптации нашего ярового рапса и для других зон выращивания. Подробнее о разновидностях рапса ярового в Европе можно узнать на сайте nuseed.com.

nuSEED®

nuseed.com

© 2015 Nuseed является зарегистрированной торговой маркой компании Nufarm Australia Ltd.

Все материалы данной публикации охраняются авторским правом. Данная публикация, полностью или частично, не может воспроизводиться в каком бы то ни было виде без разрешения компании Nuseed. Предоставленная в данной публикации информация носит исключительно информационный характер. Компания Nuseed приняла все необходимые меры для того, чтобы обеспечить точность данной информации на момент ее публикации. Несмотря на это, компания Nuseed не может гарантировать полное отсутствие в ней каких-либо недочетов или ошибок.